

## ロタウイルスワクチン(ロタリックス・ロタテック)の違いについて

	ロタリックス	ロタテック
効能・効果	弱毒生ヒトロタウイルスを有効成分とし、ロタウイルス血清型のG1型に起因する胃腸炎の予防に効果がある。また、非G1型に対する効果も認められている。	ロタウイルスの血清型のうち、G1型、G2型、G3型、G4型、PIA[8]型の弱毒生ロタウイルス株を含む5価ワクチンであり、これらの血清型に起因するロタウイルス胃腸炎の予防に効果がある。
接種回数	<u>2回</u>	<u>3回</u>
接種間隔	1回目：生後6週以上 2回目：1回目から4週間以上の間隔をおく	1回目：生後6週以上 2回目：1回目から4週間以上の間隔をおく <u>3回目：2回目から4週間以上の間隔をおく</u>
	生後6週以上 <u>24週未満</u> に接種を完了させる。	生後6週以上 <u>32週未満</u> に接種を完了させる。
接種料金	1回当たり 14,000～15,000円程度 (全額自己負担)	1回当たり 8,500～9,500円程度 (全額自己負担)
公費助成	予防接種法に基づかない任意の予防接種となることから、公費助成は行っていない。	
接種量 接種方法	1回、 <u>1.5ml</u> 経口接種	1回、 <u>2.0ml</u> 経口接種
互換性	二つのワクチンの互換性に関する安全性、有効性、免疫原性のデータはないことから、片方を接種した後に、もう片方のワクチンを接種することはできないので、 <u>いずれか一方のワクチンを用いて、必要回数分の接種をしなければならない。</u>	

宇都宮市保健所 保健予防課感染症予防グループ  
連絡先 ☎ (028) 626-1114